



PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<p>(51) Internationale Patentklassifikation 7 : G01N 33/74</p>	A2	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/22439</p> <p>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 20. April 2000 (20.04.00)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/07692</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 13. Oktober 1999 (13.10.99)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: 198 47 690.6 15. Oktober 1998 (15.10.98) DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): B.R.A.H.M.S DIAGNOSTICA GMBH [DE/DE]; Komturstrasse 19-20, D-12099 Berlin (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BERGMANN, Andreas [DE/DE]; Baumläuferweg 47, D-12351 Berlin (DE). STRUCK, Joachim [DE/DE]; Holsteinische Strasse 28, D-12161 Berlin (DE). WEGLOHNER, Wolfgang [DE/DE]; Lorenzweg 2, D-12099 Berlin (DE).</p> <p>(74) Anwälte: ANDRAE, Steffen; Andrae Flach Haug, Balanstrasse 55, D-81541 München (DE) usw.</p>		<p>(81) Bestimmungsstaaten: JP, US; europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i></p>
<p>(54) Title: METHOD AND SUBSTANCES FOR DIAGNOSIS AND THERAPY OF SEPSIS AND SEPSIS-LIKE SYSTEMIC INFECTIONS</p> <p>(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND SUBSTANZEN FÜR DIE DIAGNOSE UND THERAPIE VON SEPSIS UND SEPSISÄHNLICHEN SYSTEMISCHEN INFEKTIONEN</p> <p>(57) Abstract</p> <p>The invention relates to applications of recombinant procalcitonin 3-116 for the diagnosis and therapy of septic diseases and to the measurement of prohormones different from procalcitonin and dipeptidyl peptidase IV as biomarker in the diagnosis of sepsis.</p> <p>(57) Zusammenfassung</p> <p>Verwendungen von rekombinantem Procalcitonin 3-116 im Rahmen der Diagnose und Therapie von septischen Erkrankungen sowie die Messung von anderen Prohormonen als Procalcitonin sowie von Dipeptidyl Peptidase IV als Biomarker im Rahmen der Sepsisdiagnose.</p>		

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidsschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	CN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Verfahren und Substanzen für die Diagnose und Therapie von Sepsis und sepsisähnlichen systemischen Infektionen

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, die sich aus neuen, experimentell abgesicherten Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Auftreten von Procalcitonin bzw. Procalcitonin-Teilpeptiden bei Sepsis und sepsisähnlichen schweren systemischen Infektionen ableiten ließen.

Aus den Patenten DE 42 27 454 bzw. EP 0 656 121 B1 bzw. US 5,639,617 ist es bekannt, daß die Bestimmung des Prohormons Procalcitonin bzw. von sich davon ableitenden Teilpeptiden in einem Serum oder Plasma eines Patienten, bei dem ein Sepsisrisiko besteht bzw. bei dem sepsistypische Krankheitserscheinungen festgestellt werden, ein wertvolles diagnostisches Hilfsmittel zur Früherkennung, d.h. zur Erkennung von Infektionen, die zu Sepsis führen können, und deren Abgrenzung von nicht-infektiösen Ätiologien, zur Erkennung des Schweregrads und zur therapiebegleitenden Verlaufsbeurteilung von Sepsis und sepsisähnlichen systemischen Infektionen darstellt. Besonders wertvoll hat sich die genannte Bestimmung zur differentialdiagnostischen Unterscheidung von

Krankheiterscheinungen, die auf systemische mikrobielle Infektionen zurückzuführen sind, von anderen Krankheitserscheinungen nicht-infektiöser Ätiologie erwiesen, die aufgrund ihres klinischen Erscheinungsbildes auf eine Sepsis hindeuten könnten, jedoch in Wirklichkeit nicht auf eine systemische mikrobielle Infektion zurückzuführen sind, z.B. von Krankheiterscheinungen, die auf nicht-infektiöse Entzündungen einzelner Organe, auf postoperative Abstoßungsreaktionen oder Krebserkrankungen zurückzuführen sind. Auch können systemische Entzündungen von lokalen abgegrenzt werden.

Bezüglich eines Überblicks über den jüngeren Erkenntnisstand wird verwiesen auf W. Karzai et al. in Infection, Vol. 25 (1997), 6, S. 329-334 und die darin zitierte bzw. erwähnte weitere Fachliteratur.

Procalcitonin ist bekanntgeworden als Prohormon von Calcitonin, und seine vollständige Aminosäuresequenz ist seit längerem bekannt (FEBS 167 (1984), S. 93-97). Procalcitonin wird unter normalen Umständen in den C-Zellen der Schilddrüse produziert und dann spezifisch in das Hormon Calcitonin sowie die weiteren Teilpeptide Katalcalcin und einen N-terminalen Rest aus 57 Aminosäuren ("Aminoprocaltitonin") gespalten.

Da bei Sepsis stark erhöhte Procalcitonin-Spiegel auch bei Patienten beobachtet werden, denen die Schilddrüse völlig entfernt wurde, mußte der Schluß gezogen werden, daß das im Blut von Sepsispatienten nachweisbare Procalcitonin außerhalb der Schilddrüse gebildet wird, wobei bezüglich der Organe bzw. Zellen oder der Gewebe, die für die Procalcitonin-Produktion bei Sepsis bestimmend sind, in der Fachliteratur unterschiedliche Vermutungen, die teilweise durch experimentelles Material gestützt wurden, geäußert wurden.

Was die Natur des bei Sepsis als "Procalcitonin" bestimmten

Peptids angeht, so wurde zwar in den o.g. Patenten von Anfang an klargestellt, daß das bestimmte Peptid nicht völlig mit dem bekannten Procalcitonin-Peptid voller Länge identisch sein muß, das in den Schilddrüsen als Calcitonin-Vorläufer gebildet wird. Die Frage, ob sich das im Falle von Sepsis gebildete Procalcitonin von dem in den Schilddrüsen gebildeten Procalcitonin unterscheidet, blieb jedoch bisher ungeklärt. Als mögliche Unterschiede waren posttranslationale Modifikationen des bekannten Procalcitonins wie Glykosylierungen, Phosphorylierungen oder Veränderungen der Primärstruktur denkbar, jedoch auch modifizierte, verkürzte oder verlängerte Aminosäuresequenzen. Da die bisher angewandten analytischen Bestimmungsverfahren keine Unterschiede zwischen dem als Calcitonin-Vorläufer bekannten Procalcitonin und dem bei Sepsis gebildeten Procalcitonin erkennen ließen, wurde vorläufig allgemein davon ausgegangen, daß das bei Sepsis gebildete Procalcitonin mit dem Calcitonin-Vorläufer identisch ist und somit ein Peptid mit der bekannten Procalcitonin-Sequenz von 116 Aminosäuren (Procalcitonin 1-116) darstellt.

Wie die nachfolgend im experimentellen Teil dieser Anmeldung genauer erläuterten Bestimmungen im Labor der Anmelderin ergeben haben, unterscheidet sich das bei Sepsis gebildete Procalcitonin jedoch zwar geringfügig, jedoch signifikant von dem in der Schilddrüse gebildeten vollständigen Procalcitonin 1-116. Aus den festgestellten Unterschieden ergaben sich dann eine Reihe von wissenschaftlichen Schlußfolgerungen, die in neue diagnostische und therapeutische Verfahren, darin verwendbare Substanzen bzw. weiterverfolgbare wissenschaftliche Ansätze umgesetzt werden konnten.

Ausgangspunkt für den in der vorliegenden Patentanmeldung offenbarten Erfindungskomplexes ist die überraschende Erkenntnis, daß das bei Sepsis und sepsisähnlichen systemischen Infektionen im Serum von Patienten in vergleichsweise hohen Konzentrationen nachweisbare Procalcitonin nicht das

vollständige Procalcitonin 1-116 mit 116 Aminosäuren ist, sondern ein am Aminoterminus um ein Dipeptid verkürztes, ansonsten jedoch identisches Procalcitonin mit einer Aminosäuresequenz von nur 114 Aminosäuren (Procalcitonin 3-116).

Das gegenüber dem vollständigen Procalcitonin fehlende Dipeptid weist die Struktur Ala-Pro auf. Das Fehlen eines Dipeptids mit einem Prolinrest als zweite Aminosäure des Amino-Terminus des vollständigen Procalcitoninsequenz gab Anlaß zu der Vermutung, daß bei der Erzeugung des bei Sepsis nachweisbaren Procalcitonins 3-116 möglicherweise eine bestimmte Peptidase eine Rolle spielt, und zwar die sogenannte Dipeptidyl-(Amino)-Peptidase IV (DP IV oder DAP IV bzw. CD26).

Zur Bestimmung einer möglichen Rolle der Dipeptidyl-Amino-peptidase IV im Rahmen von systemischen Infektionen bzw. von Sepsis haben die Erfinder daher experimentell geprüft, ob eine Korrelation der physiologischen DAP IV Konzentrationen mit dem Nachweis einer Sepsis möglich ist. Die erhaltenen Ergebnissen zeigten eine derartige Korrelation.

Aus den erhaltenen genaueren Ergebnissen wurde ferner eine Hypothese entwickelt, daß das Auftreten hoher Procalcitonin-Konzentrationen bei Sepsis und systemischen Infektionen möglicherweise keine isolierte Erscheinung ist, sondern daß in ähnlicher Weise auch erhöhte Konzentrationen anderer Prohormone meßbar sein könnten, so daß die Bestimmung derartiger Prohormone eine mögliche Alternative zur Procalcitonin-Bestimmung darstellt bzw. geeignet ist, die Procalcitonin-Bestimmung in Einzelfällen zu ergänzen oder in diagnostisch signifikanter Weise weiter abzusichern.

Die Erkenntnis, daß bei Sepsis nicht das vollständige Procalcitonin 1-116 im Serum von Patienten gefunden wird, sondern ein verkürztes Procalcitonin 3-116, ist schließlich auch von potentielltem Interesse für die Sepsis-Therapie. In

einem Artikel von Eric S Nylen et al., Crit Care Med 1998, Vol. 26, No. 6, S. 1001-1006 werden experimentelle Befunde beschrieben, die darauf hindeuten, daß das bei Sepsis auftretende Procalcitonin nicht nur ein diagnostisch wichtiger Marker ist, der z.B. als Stoffwechsel-Abfallprodukt entstanden ist, sondern in einem infektiös bedingten Entzündungsgeschehen eine aktive Rolle als Mediator zu spielen scheint, indem Procalcitonin eine Entzündungsreaktion aufrechterhalten und verstärken kann. Diese Rolle von Procalcitonin wird gegenwärtig kontrovers diskutiert, und die bekannt gewordenen Versuchsergebnisse ergeben kein einheitliches Bild.

Die o.g. Erkenntnis, daß bei Sepsis ein am Aminoterminal um zwei Aminosäuren verkürztes Procalcitonin auftritt, legt nunmehr die Vermutung nahe, daß das Procalcitonin, das im Falle von Sepsis und anderen entzündlichen systemischen Infektionen eine aktive Rolle spielt, dieses verkürzte Procalcitonin 3-116 sein dürfte, und daß Untersuchungen, die mit dem Procalcitoninpeptid voller Länge durchgeführt wurden, u.a. aus diesem Grunde abweichende oder widersprüchliche Ergebnisse lieferten. Es ist durchaus bekannt, daß viele physiologisch aktive Peptide durch Spaltung, z.B. eine einleitende Abspaltung eines kurzen Peptidrests, in ihre eigentliche aktive Form überführt werden. Ein bekanntes Beispiel ist Angiotensin, bei dem aus dem nichtaktiven Angiotensinogen mit 14 Aminosäuren durch sukzessive Abspaltung erst eines Tetrapeptids und dann eines Dipeptids sowie schließlich einer einzelnen Aminosäure Peptide mit erheblich unterschiedlichen physiologischen Aktivitäten gebildet werden. Daß relativ geringfügige Modifikationen am N-Terminus von physiologisch aktiven Peptiden im Rahmen des Immungeschehens eine Rolle spielen und zu erheblichen Aktivitätsveränderungen bei den entsprechenden Peptiden führen können, wird durch eine Reihe von Veröffentlichungen aus der jüngsten Zeit unterstrichen, in denen jedoch keine Beziehung zu septischen Krankheitsgeschehen hergestellt wird (vgl.

z.B. J Immunol 1998, Sept. 15, 161(6):2672-5; Biochemistry 1998, Sept. 8, 37(36): 12672-80; FEBS Lett 1998, Juli 31, 432 (1-2):73-6; J Biol Chem 1998, März 27; 273 (13):7222-7; J Exp Med 1997, Dec 1; 186(11):1865-72).

Nimmt man an, daß Procalcitonin 3-116 aktiv an einem Entzündungsgeschehen beteiligt ist und für dieses verkürzte Procalcitonin spezifische molekulare Rezeptoren oder ähnliche spezifische Binder existieren, eröffnen sich neue therapeutische Möglichkeiten zur Beeinflussung des Verlaufs einer Sepsis unter Einsatz des Procalcitonins 3-116 bzw. von Agonisten und Antagonisten, die mit den Rezeptoren für das Procalcitonin 3-116 wechselwirken und damit die von diesem ausgelösten physiologischen Reaktionen und damit auch ein Entzündungsgeschehen beeinflussen können. Auch der Einsatz von spezifischen Bindern von Procalcitonin 3-116, z.B. selektiven Antikörpern, stellt einen therapeutischen Ansatz dar, der durch die hierin vermittelten Erkenntnisse eröffnet wird.

Schließlich ergab sich daraus, daß die Dipeptidyl-Aminopeptidase IV bei der Generierung des Procalcitonins 3-116 bei Sepsis und systemischen Infektionen eine Rolle spielen könnte, eine weitere Hypothese, nämlich daß eine Sepsis oder ein sepsisähnliches Entzündungsgeschehen möglicherweise auch dadurch therapeutisch beeinflußt werden könnte, daß man die Dipeptidyl-Aminopeptidase IV in ihrer Wirkung beeinflußt, indem man sie z.B. durch geeignete selektive Binder, Antikörper oder ähnliche Rezeptoren-Moleküle blockiert.

Es ist Ziel der vorliegenden Patentanmeldung, die sich aus den obigen neuen Erkenntnissen und daraus abgeleiteten Schlußfolgerungen ergebenden neuen technischen Lehren patentrechtlich abzusichern, soweit diese unter Berücksichtigung des derzeitigen Erkenntnisstandes einem Patentschutz zugänglich sind.

Die beigefügten Patentansprüche fassen derartige schutzfähige Lehren vorläufig zusammen. Weitere schutzfähige Lehren können sich für den Fachmann aus dem Gesamttext der vorliegenden Anmeldung unter Berücksichtigung der im experimentellen Teil angeführten Versuchsbedingungen und Versuchsergebnisse sowie den zugehörigen Erläuterungen ergeben. Die Beanspruchung derartiger Lehren durch zusätzliche Ansprüche bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf mehrere Diagramme ausgewähltes experimentelles Material vorgelegt, das die neuen Erkenntnisse untermauert bzw. das für die Richtigkeit der daraus abgeleiteten Annahmen spricht.

In den Figuren zeigen:

- Figur 1 die Ergebnisse einer Procalcitonin-Isolierung und Aufreinigung per HPLC aus einem Mischserum aus gesammelten Seren von verschiedenen Patienten mit schwerer Sepsis;
- Figur 2 die Ergebnisse einer massenspektroskopischen Untersuchung derjenigen Fraktionen des Mischserums aus Fig.1, die eine hohe Procalcitonin-Immunreaktivität aufwiesen;
- Figur 3 Ergebnisse der Bestimmung der Enzymaktivität von Dipeptidyl-Amino-peptidase IV in septischen Seren und Normalseren; sowie
- Figur 4 die Ergebnisse der Bestimmung von Procalcitonin in septischen Seren und Normalseren in Gegenüberstellung mit Ergebnissen der Bestimmung eines weiteren Prohormons, nämlich pro-Gastrin-Releasing-Peptide (proGRP), in den gleichen Seren.
- Figur 5 die Ergebnisse der Bestimmung von Procalcitonin in

Seren eines Kollektivs von 20 Normalpersonen sowie andererseits 20 Sepsispatienten.

- Figur 6 die Ergebnisse der Bestimmung von Pro-ANF (in pg/Röhrchen) in den gleichen Kollektiven von Normalpersonen und Sepsispatienten wie in Figur 5.
- Figur 7 die Ergebnisse der Bestimmung von Pro-ADM (in pg/Röhrchen) in den gleichen Kollektiven von Normalpersonen und Sepsispatienten wie in Figur 5.
- Figur 8 die Ergebnisse der Bestimmung von Pro-END (in pg/Röhrchen) in den gleichen Kollektiven von Normalpersonen und Sepsispatienten wie in Figur 5.
- Figur 9 die Ergebnisse der Bestimmung von Pro-BNP (in pg/Röhrchen) in den gleichen Kollektiven von Normalpersonen und Sepsispatienten wie in Figur 5.

EXPERIMENTELLER TEIL

A. Isolierung und Charakterisierung des endogenen Procalcitonin-Peptids aus Seren septischer Patienten

Durch Vermischen von Serumproben von verschiedenen Patienten mit schwerer Sepsis wurde ein Mischserum mit einem Gesamtvolumen von 68 ml hergestellt. Die Procalcitonin-Konzentration in dem erhaltenen Mischserum wurde mit Hilfe eines kommerziellen Procalcitonin-Assays (LUMitest PCT, B.R.A.H.M.S Diagnostica) zu 280 ng/ml (Gesamtmenge 19 µg) ermittelt. Das Mischserum wurde mit einem gleichen Volumen eines Puffers (68 ml; 10mM EDTA, 1 mg/ml Maus-IgG, 2 mg/ml Schaf-IgG, 2 mg/ml bovines IgG, 0,1 mMol Leupeptin, 50 µM Amastatin in PBS) vermischt, und das in der Probe enthaltene Procalcitonin wurde affinitätschromatographisch isoliert und gereinigt.

Hierzu wurde die gesamte Mischprobe bei einer Durchflußrate von 0,5 ml/min viermal hintereinander über eine Affinitäts-säule (0,5 x 1 cm, Anti-Calcitonin-Antikörper, gebunden an Carbolink der Firma Pierce, Procalcitonin-Bindekapazität ca. 20 µg) gepumpt. Anschließend wurde die Säule mit 30 ml PBS gewaschen, und das gebundene Peptid wurde mit Hilfe von 50 mM Essigsäure (pH ca. 2,0) eluiert. Der Säulenausfluß wurde kontinuierlich auf Absorption bei 280 nm überwacht, und die von der Essigsäure eluierte Proteinfraction wurde aufgefangen (Endvolumen 2,0 ml).

Das auf diese Weise gesammelte Material wurde über Umkehrphasen-HPLC an einer rpC_{18} -Säule μ Bondapak 0,4 x 30 mm (Firma Waters) gereinigt. Die Durchflußgeschwindigkeit betrug 1 ml/min, Laufmittel und Elutionsbedingungen sind der folgenden Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Elutionsbedingungen rp-HPLC Procalcitonin

Laufmittel A:	5 % Acetonitril		
	20 mM NH_4 -Acetat		
Laufmittel B:	90 % Acetonitril		
	20 mM NH_4 -Acetat		
Gradient:	0,0 min	100 % A	0 % B
	2,5 min	100 % A	0 % B
	5,0 min	89 % A	11 % B
	55,0 min	56 % A	44 % B
	60,0 min	0 % A	100 % B

Der Säulenausfluß wurde kontinuierlich auf seine Absorption bei 214 nm vermessen und in Fraktionen von 0,25 ml gesammelt. Mit Hilfe eines handelsübliche Procalcitonin-Assays (LUMitest PCT, B.R.A.H.M.S Diagnostica) wurden diejenigen Fraktionen bestimmt, in denen eine PCT-Immunreaktivität nachweisbar war. Es zeigte sich, daß die Haupt-Immunreaktivität in der 51. Fraktion als scharfe Bande eluiert wurde. Außerdem wurden heterogen zusammengesetzte Proteinfractionen mit geringeren PCT-Immunreaktivitäten in den Fraktionen 39 bis 49 erhalten.

Figur 1 zeigt die ermittelte PCT-Immunreaktivität (ausgedrückt als ng PCT/ml) für die einzelnen gesammelten Fraktionen der rp HPLC-Chromatographie, überlagert einer Kurve, die die optische Dichte (OD) der eluierten Fraktionen darstellt.

Alle Fraktionen, die eine positive Procalcitonin-Immunreaktivität aufwiesen, wurden durch Begasen mit Stickstoff getrocknet. Anschließend wurden die Proben massenspektrometrisch analysiert und einer N-terminalen Sequenzierung unterworfen.

Bei der massenspektrometrischen Untersuchung (MALDI-TOF-Methode) wurde für die Fraktionen 50-52 das in Figur 2 gezeigte Profil erhalten, aus dem sich eine Molmasse von 12640 ± 15 ergab. Sämtliche anderen massenspektrometrisch untersuchten Fraktionen (36-49, 53-59) ergaben heterogene Massenverteilungen mit Molmassen < 12640 . Ihre Einzelmasse ergab im Vergleich zur Intensität der Masse der Fraktion 50-52 eine Intensität von $< 2\%$. Damit wurde nachgewiesen, daß die Procalcitonin-Immunreaktivität in Seren von Sepsispatienten mit einer Masse von 12640 ± 15 assoziiert ist. Keine der gewonnenen Fraktionen wies eine höhere Masse auf.

Die in den Fraktionen 36-59 enthaltenen Peptide wurden einer N-terminalen Sequenzierung unterworfen. Auch hierbei erwies sich der Inhalt der Fraktionen 36-49 und 53-59 als heterogen, d.h. es wurde eine Vielzahl von unterschiedlichen N-Termini ermittelt.

Für die Fraktion 50-52, in denen die überwiegende Procalcitonin-Immunreaktivität zu finden war, ergab sich, daß die darin enthaltenen Peptide eindeutig folgenden N-Terminus (15 Aminosäuren) aufwiesen:

Phe Arg Ser Ala Leu Glu Ser Ser Pro Ala Asp Pro Ala Thr Leu

Das Peptid aus den Fraktionen 50-52 wurde anschließend

mittels Protease Glu-C bzw. Trypsin verdaut, die entstandenen Fragmente wurden auf an sich bekannte Weise über SMART-HPLC gewonnen und anschließend massenspektrometrisch und sequenzanalytisch untersucht.

Es wurde eine Sequenz erhalten, die vollständig mit der Sequenz der Aminosäuren 3-116 des bekannten Procalcitonins 1-116 übereinstimmte. Die theoretische Masse dieser Sequenz betrug 12627, was mit der massenspektrometrisch ermittelten Masse von 12640 ± 15 übereinstimmt.

Damit wurde nachgewiesen, daß im Blut von Sepsispatienten ein Procalcitonin-Peptid zirkuliert, das 114 Aminosäuren umfaßt und als Procalcitonin 3-116 zu bezeichnen ist. Das Peptid ist nicht durch posttranslationale Modifikationen wie Phosphorylierungen oder Glykosylierungen verändert.

Das Procalcitonin 3-116 wurde bisher in der wissenschaftlichen Literatur noch nicht als mögliches endogenes Procalcitonin-Teilpeptid diskutiert, und es bestand daher bisher für den Fachmann auch noch keinerlei Veranlassung, dieses Peptid gezielt herzustellen und auf seine Eigenschaften zu untersuchen. Die obigen Befunde lieferten nunmehr jedoch einen Anlaß zur gezielten Herstellung des genannten Procalcitonin 3-116 nach gentechnologischen Techniken. Seine Herstellung wird nachfolgend beschrieben.

B. Klonierung, Expression und Aufreinigung von rekombinantem Procalcitonin 3-116.

1. Klonierung

Die für Procalcitonin 3-116 (nachfolgend abgekürzt PCT 114) codierenden DNA-Fragmente wurden unter Anwendung einer PCR-Amplifikation mit Hilfe geeigneter Oligonukleotidprimer aus einem humanen Schilddrüsen-cDNA-Pool isoliert. Das gewünschte Fragmente wurde mittels gängiger Methoden (Ausubel FM,

Brent R, Kingston RE, Moore DD, Seidman JG, Smith JA, und Struhl K (1991), Current Protocols in Molecular Biology, John Wiley & Sons, New York) kloniert, und die korrekte Nukleotidsequenz wurde durch DNA-Sequenzierung und Vergleich mit der bekannten, für Procalcitonin codierenden DNA-Sequenz verifiziert.

Für die Expression der für PCT 114 codierenden cDNA wurde ein Vektor verwendet, der neben einem T7-Promotor eine Region enthält, die für das Signalpeptid des sog. pelB-Proteins codiert. Dieses pelB-Signalpeptid sorgt dafür, daß ein nach Klonierung und Expression entstandenes Fusionsprotein durch die cytoplasmatische Membran der für die Expression verwendeten Wirtszellen in den periplasmatischen Raum transportiert wird. Bei diesem Transportvorgang wird gleichzeitig das N-terminale Signalpeptid durch eine membranständige Signalpeptidase abgetrennt (Stader JA und Silhavy TJ (1990), Engineering Escherichia coli to secrete heterologous gene products, Methods Enzymol. 185, 166-187). Diese Vorgehensweise garantiert, daß das gefundene Expressionsprodukt exakt die gewünschte Sequenz aufweist. Bei dieser Vorgehensweise fehlt das bei anderen Methoden zur Expression notwendige N-terminale Methionin.

Nach der Klonierung der cDNA für PCT 114 in einen Vektor der genannten Art und der Transformierung von E. coli mit diesem Vektor wurde Procalcitonin 3-116 exprimiert. Die periplasmatische Fraktion mit dem exprimierten Procalcitonin 3-116 wurde auf an sich bekannte Weise isoliert (Neu HC und Heppel LA (1965), The release of enzymes from Escherichia coli by osmotic shock and during the formation of spheroblasts, J. Biol. Chem. 240, 3685-3692). Nach einer Zentrifugierung (100.000 g, 30 min, 4°C) und Filtration des flüssigen Überstands (0,2 µm) wurde das erhaltene Filtrat durch Anionen-Austauschchromatographie aufgetrennt. Die Fraktionen mit Procalcitonin-Immunreaktivität wurden vereinigt und über Umkehrphasen-HPLC aufgereinigt, wie im Zusammenhang mit der

Isolierung von PCT 3-116 aus septischen Seren beschrieben wurde.

Alle Fraktionen mit Procalcitonin-Immunreaktivität wurden vereinigt und lyophilisiert. Wie eine Überprüfung des Materials mittels SDS-PAGE ergab, war das so gewonnene Material zu mindestens 95% sauber.

Die Identität des exprimierten und aufgereinigten Peptids als Procalcitonin 3-116 wurde durch Massenspektrometrie und Sequenzanalyse bestätigt.

Das erhaltene rekombinante Procalcitonin 3-116 stellt ein neues rekombinantes Peptid dar und kann in dieser Form zur Herstellung von Immunreagenzien verwendet sowie auf seine Eignung als Therapeutikum bzw. auf seiner Fähigkeit, im Sinne der o.g. Veröffentlichung (Eric S Nylen, a.a.O.) prophylaktisch und therapeutisch zu wirken, untersucht werden.

Zur Herstellung von Kalibratoren für PCT-Assays wurde das oben für die gentechnologische Herstellung von Procalcitonin 3-116 beschriebene Verfahren in im wesentlichen identischer Form auch zur Herstellung des vollständigen Procalcitonins 1-116 und des Procalcitonins 2-116 eingesetzt.

C. Ermittlung der Dipeptidyl-Aminopeptidase IV (DAP IV)-Aktivität in humanen Normalseren bzw. Seren von Patienten mit schwerer Sepsis

Jeweils 20 Serumproben von gesunden Normalpersonen sowie von Sepsispatienten wurden auf ihre für Dipeptidyl-Aminopeptidase IV-spezifische Enzymaktivität untersucht. Die DAP IV-Enzymaktivität wurde auf an sich bekannte Weise fluorometrisch unter Verwendung von Lys-Pro-4-Methoxy-beta-naphthylamid vermessen. Dazu wurden jeweils 2 µl des zu überprüfenen Serums mit 3 ml Substrat (50 µg/ml Lys-Pro-4-Methoxy-

beta-naphthylamid, 50 mM Tris/HCl, pH 7,5) vermischt, und die auftretende Fluoreszenz wurde kontinuierlich unter Anregung mit Licht einer Wellenlänge von 340 nm bei einer Emissionswellenlänge von 410 nm gemessen. Das Fluoreszenzsignal wurde mittels einer 4-Methoxy-naphthylamin-Lösung kalibriert. Die auf diese Weise ermittelte Enzymaktivität wird in nmol/-min angegeben.

Die erhaltenen Ergebnisse sind Figur 3 dargestellt.

Es ist klar zu erkennen, daß die DAP IV-Enzymaktivität in den Sepsis-Seren deutlich niedriger liegt als in den Seren von gesunden Normalpersonen (Blutspenderseren). Damit läßt sich die Bestimmung der DAP IV-Enzymaktivität im Plasma oder Serum auch zur Erkennung von Sepsis in Patientenseren heranziehen.

Die bei Sepsis deutlich erniedrigte Plasmakonzentration an DAP IV kann einerseits als Beleg dafür angesehen werden, daß DAP IV an einem Sepsis-Geschehen mitbeteiligt ist. Andererseits deuten die Ergebnisse darauf hin, daß es nicht die Konzentration an DAP IV im Plasma sein kann, die für die Bildung von Procalcitonin 3-116 verantwortlich ist. Die erhaltenen Ergebnisse legen vielmehr den Schluß nahe, daß Procalcitonin 3-116 durch gewebs- bzw. zellgebundene DAP IV, möglicherweise intrazellulär, gebildet und aus Procalcitonin-erzeugenden oder speichernden Zellen freigesetzt wird.

Die der Literatur entnehmbare Information, daß DAP IV von aktivierten T-Zellen exprimiert wird, (vergleiche Hegen und Oravec, Protein-Reviews on the WEB; Fleischer, a.a.O.) deutet auf einen engen Zusammenhang zwischen der Expression von DAP IV und dem Aktivierungszustand des Immunsystems hin, das bei einer septischen systemischen Infektion extrem belastet ist und daher typische Reaktionen zeigt, die sich u.a. in einer stark erhöhten Procalcitonin 3-116 Bildung äußern.

Abgesehen von den sich aus den obigen Befunden ergebenden Möglichkeiten, DAP IV im Rahmen der Sepsis-Diagnose zu bestimmen, können die obigen Ergebnisse auch darauf hindeuten, daß die bei einer Sepsis kaskadenartig ablaufenden Vorgänge durch DAP IV-Hemmstoffe therapeutisch zu beeinflussen werden können, wodurch es möglich sein könnte, die Freisetzung von Procalcitonin 3-116 sowie anderen Hormonen oder konvertierten Prohormonen unter Sepsis zu verhindern oder zu vermindern, so daß pathologische Konsequenzen dieser Prohormonfreisetzung vermindert oder vermieden werden können.

D. Bestimmung der Konzentrationen anderer Prohormone als Procalcitonin bei Sepsis

Die Tatsache, daß bei Sepsis nicht das vollständige Prohormon Procalcitonin, sondern ein modifiziertes, um ein Xaa-Pro-Dipeptid verkürzte Prohormon freigesetzt wird, führte zu der Hypothese, daß bei Sepsis nicht nur Procalcitonin 3-116 freigesetzt wird, sondern daß Procalcitonin 3-116 vielleicht nur ein Vertreter aus einer ganzen Gruppe von Prohormonen oder ähnlichen Peptiden, z.B. solchen mit immunmodulatorischen Eigenschaften, ist, die bei Sepsis in erhöhtem Maße und möglicherweise konvertierter Form freigesetzt werden.

Eine Überprüfung bekannter Prohormone und der für diese Prohormone der Literatur entnehmbaren Aminosäuresequenzen zeigte, daß tatsächlich bei den meisten bekannten Prohormonen am Aminoterminus ein Dipeptid zu finden ist, daß als Xaa-Pro definiert werden kann und das daher in einem ähnlichen Sinne, wie beim Procalcitonin beobachtet, abgespalten werden kann. Im einzelnen finden sich am Aminoterminus sehr vieler Prohormone oder Immunmodulatoren Dipeptide des genannten Typs. Die nachfolgende tabellarische Übersicht über Literaturdaten gibt einen Überblick über einige ausgewählte Prohormone bzw. Immunmodulatoren, das bei diesen zu am Amino-Terminus zu findende Dipeptid sowie ihre Gesamtzahl

der Aminosäuren.

Die in der Tabelle 2 aufgeführten Prohormone stellen Beispiele für Prohormone dar, deren Konzentrationen bei Sepsis erhöht sein können, ohne daß die Aufzählung als erschöpfend anzusehen ist. Bei den Immunmodulatoren ist mit einer Beeinflussung der Aktivität durch Abspaltung eines Dipeptids zu rechnen.

Tabelle 2:

Pro-Hormon/ Immunmodulator	Dipeptid am N-Terminus	Gesamtzahl aller Aminosäuren
pro-Endothelin-1 (pro-END)	Ala Pro	195
pro-Brain-Natriuretic- Peptide (pro-BNP)	His Pro	108
pro-Atrial-Natriuretic- Peptide (pro-ANP; auch pro-Atrionatriuretischer Faktor, pro-ANF)	Asn Pro	128
pro-Leptin	Val Pro	146
pro-Neuropeptide Y	Tyr Pro	69
pro-Somatostatin	Ala Pro	92
pro-Neuropeptide YY	Thr Pro	69
Interleukin 6	Val Pro	183
Interleukin 10	Ser Pro	160
pro-Gastrin-Releasing Peptid (proGRP)	Val Pro	115
pro-Opiomelanocortin	Trp Cys	241
pro-Adrenomedullin (pro-ADM)	Ala Arg	164
Procalcitonin (PCT)	Ala Pro	116

Die bisherigen experimentellen Befunde deuten tatsächlich darauf hin, daß bei einer systemischen Infektion wie Sepsis generell Prohormone und/oder Peptid-Immunmodulatoren wie Interleukine, möglicherweise unter Modifizierung durch Abspaltung von Dipeptiden am Amino-Terminus, freigesetzt werden und daß diese durch Wechselwirkung mit zugehörigen spezifischen Rezeptoren oder anderen Bindern möglicherweise weitere Folgeschritte in der Kaskade einer Immunantwort auslösen.

Es wurde parallel zu einer Procalcitonin-Bestimmung in Normalseren und Seren von Sepsis-Patienten auch die Bestimmung weiterer Prohormone durchgeführt, die eher willkürlich ausgewählt ausgewählt worden waren. Es waren dies (i) das pro-Gastrin-Releasing Peptide (proGRP), (ii) das pro-Atrial-Natriuretic-Peptide (pro-ANP bzw. pro-ANF), (iii) das pro-Adrenomedullin (pro-ADM), (iv) das pro-Endothelin (pro-END) und (v) das pro-Brain-Natriuretic-Peptide (pro-BNP).

D.1. Bestimmung von proGRP in Seren von Sepsis-Patienten und von Normalpersonen

Für die Bestimmung von proGRP ist ein Assay im Handel. ProGRP wird in einer jüngeren Veröffentlichung als Tumormarker beim kleinzelligen Bronchialkarzinom beschrieben (Petra Stieber et al, J Lab Med 1997, 21(6):336-344). Der Assay zur Bestimmung von ProGRP wird von der Tönnies Corporation unter der Bezeichnung ProGRP ELISA KITTM im Handel angeboten.

Unter Verwendung dieses Kits wurden unter Einhaltung der Arbeitsweise, die in der Gebrauchsinformation des kommerziellen Kits vorgeschrieben ist, die in Figur 4 dargestellten Meßergebnisse erhalten.

Ein Vergleich der für Procalcitonin einerseits und ProGRP andererseits erhaltenen Werte zeigt, daß bei Procalcitonin die Unterscheidung zwischen Normalseren und Sepsis-Seren zwar eindeutiger ist, daß aber die ProGRP-Konzentrationen in weitgehend ähnlicher Weise erhöht ist wie die von Procalcitonin.

D.2. Bestimmung von pro-ANF, pro-ADM, pro-END und pro-BNP in Seren von Sepsis-Patienten und von Normalpersonen

Zur Bestimmung der (Prä-)Prohormone pro-ANF, pro-ADM, pro-END bzw. pro-BNP sind Assays der Firma DRG (DRG Instruments GmbH, D-35018 Marburg, Deutschland) in Kitform im Handel

erhältlich, die für die nachfolgenden Messungen unter Beachtung der Anweisungen der Hersteller verwendet wurden.

Im einzelnen wurden verwendet:

Zur Bestimmung von pro-ANF der Prepro-ANF 26-55 (human) RIA Kit, zur Bestimmung von pro-ADM der Pro-Adrenomedullin 45-92 (human) RIA, zur Bestimmung von pro-END der Prepro-Endothelin 18-50 (human) RIA Kit, und zur Bestimmung von Pro-BNP der Prepro-BNP 22-46 (human) RIA Kit der o.g. Firma DRG.

In den Seren eines Kollektivs von 20 Normalpersonen A-T sowie von 20 Sepsispatienten wurden die o.g. Prohormone sowie, parallel dazu, Procalcitonin bestimmt. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle 3 zusammengefaßt. Die Daten der Tabelle 3 sind außerdem auch noch in den Figuren 5 bis 9 graphisch veranschaulicht.

Die gezeigten Ergebnisse lassen bei allen gemessenen Prohormonen bei Sepsispatienten gegenüber Normalpersonen einen mehr oder weniger klar ausgeprägten Anstieg der Werte erkennen, wenn auch die Unterscheidung von Normalpersonen und Sepsispatienten bei der Bestimmung von Procalcitonin am ausgeprägtesten ist.

Bei einer ergänzenden Literaturrecherche wurde ferner eine Veröffentlichung in J. Endocr. (1988) 119, S.159-165 ermittelt; die sich mit der Charakterisierung von Pro-Opiomelanocortin-(POMC)-verwandten Peptiden bei septischem Schock befaßte. Es geht in der Veröffentlichung um die Frage einer erhöhten endogenen Opioid-Aktivität bei septischem Schock und deren Beeinflussung durch Verabreichung von Steroiden. Ein direkter Einfluß eines infektiösen Geschehens oder eine Beeinflussung der Meßwerte durch Antibiotika wird nicht diskutiert. Aufgrund der Fragestellung in der genannten Veröffentlichung besteht keine logische Möglichkeit zu einer verallgemeinernden Diskussion der berichteten Ergebnisse

unter Einbeziehung anderer Prohormon-Peptide. Erst angesichts der hierin offenbarten Lehre der vorliegenden Erfindung läßt sich die genannte Veröffentlichung retrospektiv als weiterer Hinweis auf eine generelle Erhöhung von Prohormonen bei Sepsis interpretieren.

Die Prüfung weiterer Prohormone ist angesichts der hierin offenbarten Ergebnisse als Routinemaßnahme anzusehen, und wenn derartige Prüfungen zu positiven Ergebnissen führen und die Bestimmung derartiger weiterer Prohormone zur Sepsisdiagnose verwendet wird, wird daher von der Lehre der vorliegenden Anmeldung Gebrauch gemacht.

Tabelle 3:

	PCT [ng/ml]	Pro-ANF [pg/tube]	Pro-ADM [pg/tube]	Pro-END [pg/tube]	Pro-BNP [pg/tube]
<u>Normalpatienten:</u>					
A	0,07	69,4	64	29,3	31,1
B	0,26	26,6	50,2	15,4	30,1
C	0,10	14,7	1,0	1,0	24,7
D	0,06	53,2	77,8	19,3	27,4
E	0,06	51,1	66,5	20,6	25,4
F	0,04	95,5	53,5	28,2	28,9
G	0,07	117	83,5	18,3	17,3
H	0,10	88,1	52,3	25,1	28,1
I	0,10	69,4	107	23,2	25
J	0,07	38,3	91,1	26,1	25,7
K	0,06	111	64,9	22,8	29,6
L	0,09	73,8	66,3	32,4	21,6
M	0,07	42	58,9	27,1	23,7
N	0,09	107	114	27,3	31,2
O	0,10	56,7	62,5	20,3	26,2
P	0,10	47,2	51,7	24,5	33,3
Q	0,12	155	72,5	34,6	36,7
R	0,13	92,1	64,7	29,6	35,2
S	0,12	153	100	34,7	36
T	0,11	78	69,6	27,1	37,7
<u>Sepsispatienten:</u>					
13a	1,1	333	195	70	34,9
10a	11,9	62,5	154	30,5	30,4
18b	6,4	323	209	75,4	46,4
19b	21,2	346	180	71,6	50,7
8a	1,8	303	203	70,3	48,8
9a	24,7	271	205	78,4	33,6
9b	29,0	305	210	62,5	40,3
12b	5,8	324	204	67,4	36,1
10b	1,9	127	128	30,5	33,9
16a	86,7	347	198	83,3	39
8b	1,1	138	153	29,6	33,7
20a	1,4	167	176	41,3	30,9
20b	1,1	170	178	39	34,9
13b	0,8	295	186	45,3	36,9
19a	17,6	354	201	58,6	54,5
7b	2,5	356	199	78,6	
7a	2,9	345	197	148	
16b	40,0	343	197	88,1	43,9
12a	5,2	327	216	76,1	34,3
15b	1,9	420	215	82,5	52

Patentansprüche

1. Verfahren zur differentialdiagnostischen Früherkennung und Erkennung, zur Beurteilung des Schweregrads und zur therapiebegleitenden Verlaufsbeurteilung von Sepsis und schweren Infektionen, insbesondere sepsisähnlichen systemischen Infektionen, dadurch gekennzeichnet, daß man in einer Probe einer biologischen Flüssigkeit eines Patienten den Gehalts mindestens eines Peptid-Prohormons, das nicht Pro-calcitonin ist, und/oder eines sich davon ableitenden Teilpeptids, das nicht das aus dem Peptid-Prohormon erhältliche eigentliche Hormon ist, bestimmt und aus der festgestellten Anwesenheit und/oder Menge des bestimmten Prohormons auf das Vorliegen einer Sepsis oder sepsisähnlichen systemischen Infektion, ihren Schweregrad und/oder den Erfolg einer therapeutischen Behandlung schließt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Peptid-Prohormon ausgewählt ist aus pro-Gastrin-Releasing Peptid (proGRP), pro-Endothelin-1 (pro-END), pro-Brain-Natriuretic-Peptid (pro-BNP), pro-Atrial-Natriuretic-Peptid (Pro-ANP bzw. pro-ANF), pro-Leptin, pro-Neuropeptid-Y, pro-Somatostatin, pro-Neuropeptid-YY oder pro-Adrenomedullin (pro-ADM).

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß durch die Bestimmung ein Teilpeptid erfaßt wird, das sich von dem bekannten vollständigen Prohormon-Peptid durch das Fehlen eines Dipeptids am Amino-Terminus unterscheidet, wie es von der Dipeptidyl-Aminopeptidase IV (DP IV oder DAP IV oder CD26) vom Ende eines Peptids abspaltbar ist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Dipeptid ein Xaa-Pro-Dipeptid ist, wobei Xaa für die

aminoterninale Aminosäure des vollständigen Prohormon-Peptids steht.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die Bestimmung als Immunoassay oder Präzipitationsassay durchführt und auf Sepsis oder sepsis-ähnliche schwere Infektionen schließt, wenn die Konzentration des bestimmten Peptid-Prohormons signifikant über den Werten liegt, die bei gesunden Normalpersonen beobachtet werden können.
6. Verfahren zur differentialdiagnostischen Früherkennung, zur Erkennung des Schweregrads und zur therapiebegleitenden Verlaufsbeurteilung von Sepsis und sepsisähnlichen systemischen Infektionen, dadurch gekennzeichnet, daß man in einer serum- oder Plasmaprobe eines Patienten den Gehalt an Dipeptidyl-Peptidase IV (DP IV; Dipeptidyl-Aminopeptidase IV; DAP IV oder CD 26) bestimmt und aufgrund einer gegenüber gesunden Normalpersonen signifikant erniedrigten Konzentration das Vorliegen einer Sepsis oder sepsisähnlichen systemischen Infektion diagnostiziert.
7. Gentechnologisch hergestelltes Procalcitonin 3-116.
8. Verfahren zur gentechnologischen Herstellung von Procalcitonin 3-116, bei dem man eine für die 114 Aminosäuren des Procalcitonins 3-116 codierende cDNA-Sequenz in einen geeigneten Vektor inseriert, mit dem gebildeten Vektor geeignete Wirtszellen transformiert, so daß diese Procalcitonin 3-116 exprimieren, daß man die Wirtszellen aufarbeitet und eine das exprimierte Procalcitonin 3-116 enthaltende Fraktion isoliert und daraus durch chromatographische Reinigung das gentechnologisch hergestellte Procalcitonin 3-116 in wenigstens 90%iger Reinheit gewinnt.
9. Verwendung von rekombinant hergestelltem Procalcitonin 3-116 als Kalibrator in Procalcitonin-Assays oder zur Her-

stellung von Therapeutika zur Vorbeugung und Behandlung von Sepsis und sepsisähnlichen systemischen Infektionen.

10. Verfahren zur Messung von Procalcitonin 3-116 als indikationsunabhängiger Diagnostikparameter.

HPLC-Reinigung von affinitätsgereinigtem humanen PCT





Fig. 1

2/10

Fig. 2



Enzymaktivität von DAP IV in septischen Seren vs. Blutspenderseren




Fig. 3

Vergleich der Procalcitonin-Konzentration von Normalpatienten vs. Sepsispatienten




Fig. 5

7/10

Vergleich der Prepro-ANF (26-55)-Konzentration von
Normalpatienten vs. Sepsispatienten




Fig. 6

Vergleich der Pro-Adrenomedullin (45-92)-Konzentration von Normalpatienten vs. Sepsispatienten




Fig. 7

Vergleich der Prepro-Endothelin (18-50)-Konzentration von
Normalpatienten vs. Sepsispatienten




Fig. 8

Vergleich der Prepro-BNP (22-46)-Konzentration von Normalpatienten vs. Sepsispatienten




Fig. 9

THIS PAGE BLANK (USPTO)